



Estació d'avísos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de La Tallada d'Empordà

Avís del dia: 25 de juliol de 2025
Avís núm.: 9/2025

FRUITERS:

AVÍS REALITZAT EN COL·LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE FRUITA I CULTIUS EXTENSIVS DE GIRONA

Avís destacat

Diabrotica (*Diabrotica virgifera virgifera*)

Primera detecció a Girona d'aquesta plaga que pot tenir efectes greus en blat de moro. Mes informació a l'apartat d'extensius de l'avís.

Per tots els fruiters:

Bernat marbrejat

En aquest moment trobem ninfes de tots els estadis. Cal estar alerta de la seva presència al camp per poder valorar la necessitat de fer un tractament segons el nivell d'afectació i la localització dels individus.

Mosca de la fruita

Ja s'han capturat les primeres mosques de la fruita. Ja es poden instal·lar les trampes de captura massiva.

Aranya roja

Els mesos de juliol i primera quinzena d'agost és quan és més fàcil que aquesta plaga ens doni algun problema. Cal revisar les plantacions i tractar només si es troben més del 50% de les fulles ocupades i no hi ha fitoseids.

Pomeres i Perers:

Carpocapsa

El vol de la primera generació ha començat a baixar. Recomanem continuar alerta a l'aparició dels danys de la segona generació. I en cas de detectar danys recents o més de 2 captures per trampa i setmana efectuar algun tractament.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de La Tallada d'Empordà

Pandemis

Es recomana tractar només allà a on hi hagi un vol superior a 15 adults per trampa i setmana.

Zeuzera

L'aparició de danys de la nova generació pot produir-se a partir d'ara. Cal vigilar especialment les plantacions en formació i prendre mesures proporcionades als danys. Els símptoma principal és la dessecació dels brots terminals degut a que les oruges joves han començat a barrinar dins.

Pugons

Recomanem revisar les plantacions per pugó gris i pugó llanós. Només es recomana tractar allà on les colònies o la seva melassa pugui malmetre directament la fruita.

Alternaria

Cal revisar bé les plantacions per detectar lesions d'alternària en fulles i fruits. A aquelles parcel·les que presentin danys, cal estar pendent de les humitats relatives altes que afavoreixen aquesta malaltia i tractar si es considera convenient.

Pomeres:

Oidi, fum o cendrosa (*Podosphaera leucotricha*)

En aquelles parcel·les que s'observin taques, cal estar pendent de les humitats relatives altes que afavoreixen aquesta malaltia i tractar en el cas de detectar l'aparició de taques recents.

Glomerella:

Les finques amb antecedents d'aquesta malaltia hauran d'estar atentes a les pluges del mes de juliol, ja que són moments estratègics per evitar la dispersió del patogen.

Pereres:

Psil·la (*Cacopsylla pyri*)

Cal revisar les plantacions i tractar si hi ha més del 10% de brots ocupats per la plaga, afegint-hi un dissolvent de melassa.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de La Tallada d'Empordà

Stemphylium vesicarium

Estem en període favorable a la malaltia. Les finques normalment afectades convé mantenir-les protegides amb fungicides específics.

CULTIUS EXTENSIUS:

AVÍS REALITZAT EN COL·LABORACIÓ AMB LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL DE CONREUS EXTENSIUS DE GIRONA

Conreus extensius d'estiu:

Diabrotica (*Diabrotica virgifera virgifera*)

S'ha identificat *Diabrotica virgifera*, és un insecte que en fase adulta és un escarabat diminut, d'uns 5-6mm, que posa els ous al terra un cop a l'any. A la primavera, els ous desclouen i les larves mengen de les arrels.

És important la detecció de les primeres invasions en parcel·les per intentar erradicar totalment l'insecte. Davant de qualsevol sospita, el que cal fer és avisar els tècnics del Servei de Sanitat Vegetal de la vostra zona.

Contra aquesta plaga, es recomanen preferentment la **Rotació de cultius** (més eficient) així com ús de productes fitosanitaris per al control d'adults, neteja de maquinària agrícola i eliminació de plantes espontànies del panís fora de la zona de producció.

Productes: contra "*Diabrotica virgifera*", productes a base de cipermetrín, deltametrín, lambda cihalotrín i teflutrín. Aquests són tractaments contra adults i n'eviten la posta.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de La Tallada d'Empordà



Més informació:

<https://extensius.cat/wp-content/uploads/pdf/6249/diabrotica-virgifera-virgifera-danys-i-distribucio-de-la-plaga.pdf>

Barrinadors

S'han detectat danys de barrinadors en blat de moro. Les erugues d'*Agrotis sp* s'alimenten de la base i el coll de la tija. També poden afectar a les fulles. En casos de presència elevada poden acabar amb la planta jove.

Els tractaments fitosanitaris es recomana fer-los a última hora del dia, quan l'activitat de les larves és més intensa.

Per determinar el tractament més adient contacteu amb el vostre tècnic de l'ADV.

Conreus extensius d'hivern:

Nysius ericae (Xinxà de la colza):

S'ha identificat *Nysius ericae*, es tracta d'una xinxà fitogafa i polífaga, d'uns 3-4 mm de color marronós o grisenc amb ales.

No representa cap risc per als cultius ni per les persones. Només certa alarma per la aparició sobtada de poblacions elevades de l'insecte.

Par tal de controlar aquest insecte, després de la sega de la colza cal passar els discos, cultivador o similar, per enterrar la palla de la colza eliminant així la plaga, realitzant un treball superficial al sòl.



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de La Tallada d'Empordà



Imatge 1. *Nysius ericae*. Font: Antti Salovaara

Per més informació podeu consultar el següent enllaç:

<https://extensius.cat/2020/06/25/el-xinxà-de-la-colza-nysius-ericae/>

Unitat de Sanitat Vegetal a Girona (972 45 43 10)

Unitat de Sanitat Vegetal a Girona
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
17486 Castelló d'Empúries