

CEBA

Allium cepa L. Família: Liliaceae

CICLE DE LA CEBA

Cicle: tardà Sembra: gener-febrer Recol·lecció: juliol-agost



CLIMA

- La temperatura òptima per al desenvolupament seria d'uns 13-24 °C (a T^a < 2°C no hi ha germinació).
- Planta resistent al fred que necessita altes temperatures i fotoperíodes llargs per al creixement del bulb.

SÒLS

- Cultiu exigent en característiques del sòl. Cultiu amb tolerància mitjana a la salinitat. pH òptim 6-6.5
- Sòl òptim: de textura franco-argilosa, ric en matèria orgànica ben descomposta i bona retenció de la humitat en els 15-25 cm superiors del sòl.

PARTICULARITATS DEL CULTIU / TÈCNiques DE CULTIU

Sembra / Plantació

- No requereix unes labors profundes (les arrels del cultiu són poc profundes), però el terreny és millor homogeni i fi en la part superficial per afavorir la germinació.
- Sembra directa amb sembradores de 10-12 línies. També es pot fer el naixement en planter i posterior trasplantament.

Recol·lecció

- A partir de la caiguda o assecament de les fulles, cal esperar uns dies perquè el bulb s'assequi (el nombre de dies varia en funció del clima).

Reg

- És una de les operacions del cultiu més importants. Cultiu sensible a l'excés d'humitat, però les necessitats augmenten a mesura que avança el creixement del bulb, si bé s'atura quan comença la maduració (bulb format).
- És necessari regar després de la plantació i posteriorment, a intervals. Interrompre el reg els 15-30 dies abans de la recol·lecció.

FERTILITZACIÓ I CONTROL DE MALES HERBES

- L'adobament orgànic s'ha de fer uns mesos abans de cultivar i s'ha de procurar enterrar o eliminar les restes del cultiu anterior.
- Fraccionament de les aportacions. S'acostuma a fer un adobament de fons i dos de cobertera.
- És un cultiu molt sensible a les males herbes. S'han de repetir els tractaments herbicides durant el període de cultiu, però cal un control exhaustiu en cada moment de l'aplicació.

OBSERVACIONS

- El cultiu no ha de repetir-se durant 3-5 anys. S'han de fer rotacions de cultius.
- Precedents: són bons precedents les hortalisses (excepte les liliàcies com l'all, el porro i la mateixa ceba) i els cereals.
- Els rendiments poden ser entre 30 i 60 tn/ha, segons la varietat.
- El clima de les Terres de Lleida en permet la conservació a temperatura ambient (sota cobert), però amb la necessitat d'algun tractament preventiu per evitar el grillament.

VARIETATS

- Les varietats més conegudes actualment a la zona són: Figueres, *Recas*, gra d'or i bavosa.

PLAGUES I MALALTIES

Algunes de les plagues i malalties més comunes són:

Plagues		Malalties	
Mosca de la ceba	Nematodes	Malalties del coll a l'arrel	Bacteris
Pugó	Tinya de la ceba	Podridura blanca i gris	Míldiu
Dormidores i cucs de filferro	Trips de la ceba	Alternària	Rovell



És una publicació del **PUNT SEGARRA-GARRIGUES**. Carretera N-II. Centre Comercial 1a planta. 25300 Tàrraga
Tel. 973 314500. A/e: puntsega@ambitrural.com. Coordinadora de la informació: Marta Batalla. Edició: Edicions La Terra S.L.

